

RIDOMIL GOLD MZ 68 WP

Fungicida

Principio Activo: Mancozeb; Metalaxil- M

Formulación: Polvo mojable.

Categoría Toxicológica: Categoría IV (cuatro)

Registro M.G.A.P. No.: 2411

1. Características

Ridomil Gold MZ 68 WP es un fungicida sistémico y de contacto efectivo para el control de enfermedades causadas por *Peronospora*, *Phytophthora* y otros hongos de la clase de los Oomicetes.

El componente sistémico del Ridomil Gold MZ 68 WP (Metalaxil- M) es rápidamente absorbido por las partes verdes de la planta (30 minutos), distribuyéndose acropetalmente, inclusive a los nuevos brotes aparecidos después de la aplicación, actúa suprimiendo el crecimiento y reproducción del hongo.

El otro componente (Mancozeb) proporciona la acción de contacto complementaria desde el exterior (inhibe la germinación de esporas).

2. Cuadro de cultivos

Cultivo	Enfermedades	Patógenos	Dosis	Intervalo de Aplicaciones	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	250 g/ 100 l (2,5 Kg/ há.)	10 - 14 días	Usar Ridomil Gold MZ 68 WP en forma preventiva durante el período de activo crecimiento de la papa. Realizar como máximo 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Tomate	Tizón tardío	<i>Phytophthora infestans</i>	350 g/ 100 l (3,5 Kg/ há.)	7 - 10 días	1 ^a aplicación cuando las condiciones ambientales favorecen el ataque de <i>Phytophthora</i> , o sea clima húmedo con temperaturas de 15- 20° C. Máximo 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.
Vid	Peronospora	<i>Plasmopora vitícola</i>	250 g/ 100 l (2,5 Kg/ há.)	10 - 14 días	3- 4 aplicaciones preventivas al inicio del crecimiento activo, la última aplicación con Ridomil Gold MZ 68 WP debe ser realizada 14 días después de terminada la floración.
Cebolla	Peronospora	<i>Peronospora destructor</i>	250 g/ 100 l (2,5 Kg/ há.)	10 - 14 días	Empezar las aplicaciones cuando las condiciones ambientales favorecen a la aparición de las enfermedades. Realizar como máximo 3 aplicaciones preventivas por ciclo de cultivo.
Pepino	“Mildiu”	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	250 g/ 100 l (2,5 Kg/ há.)	10 - 14 días	

3. Época de aplicación:

Ver tabla para cada uno de los cultivos.

4. Frecuencia de las aplicaciones

Realizar como máximo 3 - 4 aplicaciones preventivas por temporada.

5. Tiempo de espera

Papa, vid: No se establecen tiempos de espera debido a la frecuencia, dosis y número de aplicaciones establecidos en momento de aplicación.

Cebolla: 7 días.

Tomate y Pepino: 3 días.

6. Modo de aplicación:

- Cargar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador.
- Agregar la cantidad calculada de Ridomil gold MZ 68 WP.
- Agitar hasta formar una suspensión libre de grumos.
- Completar la cantidad de agua requerida.

7. Método de aplicación

Las aplicaciones pueden ser hechas con equipos de alto o bajo volumen. Usar boquillas cono hueco.

Las dosis indicadas por 100 litros se refieren a aplicaciones hasta el punto de goteo. En caso de utilizar menor cantidad de agua, el caldo de aspersión debe ser concentrado acordemente.

IMPORTANTE

- Dentro de los 7- 10 días después de la última aplicación de Ridomil gold MZ 68 WP, aplica un fungicida con modo de acción diferente al del Metalaxil- M.
- Ridomil gold MZ 68 WP tiene efecto parcial sobre otras enfermedades contra las que el Mancozeb es efectivo, sin embargo las mismas podrían no ser bien controladas cuando existe alta presión de la enfermedad y el producto es usado con intervalos de 10- 14 días. En dicho caso podría ser necesario complementar las aplicaciones de Ridomil gold MZ 68 WP con otros productos (por ejemplo: contra Alternaria en papa y tomate se recomienda complementar con Score 250 EC).

7. Contradicciones: No tiene**8. Compatibilidades:** RIDOMIL GOLD MZ 68 WP puede ser mezclado con la mayoría de los productos normalmente utilizados en los cultivos para los cuales está recomendado.**9. Riesgo Ambiental**

Toxicidad para abejas: no tóxico.